

APISTYM

Opis

Produkt wzmacniający odporność pszczół

Mieszanina paszowa uzupełniająca dla pszczół

Skład w 1000 ml:

4.1.3. Sacharoza 500 g

Dodatki:

2.b. Wyciąg z żeńszenu 50 g w 1000 ml

1.a. Kwas mlekowy 8,3 ml w 1000 ml

Wilgotność: 45 %

Skład analityczny:

Białko ogólne 226 g/kg $\pm$ 8 g/kg

Włókno surowe 4,12 g/kg $\pm$ 2,0 g/kg

Popiół surowy 516 g/kg $\pm$ 31 g/kg

Fosfor 86,6 g/kg $\pm$ 5,0 g/kg

Wskazania

Apistym służy do poprawy kondycji rodzin pszczelich. Stosowanie preparatu zwiększa odporność rodzin pszczelich na choroby, w szczególności na nosemozę, wywołaną przez *Nosema apis* i *Nosema ceranae*.

Właściwości

Zawarty w Apistymie ekstrakt żeńszenu wpływa na wzrost poziomu oksydazy fenolowej (enzymu biorącego udział w odpowiedzi immunologicznej), podnosząc odporność rodziny i zwiększając jej vitalność. Dzięki temu pszczoły łatwiej zwalczają zakażenia patogenami. Apistym podawany przy dokarmianiu jesiennym zwiększa przeżywalność rodzin pszczelich w zimie, a stosowany wiosną przyspiesza ich rozwój.

Dawkowanie i sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć!

Przygotowanie Apistymu z roztworem syropu cukrowego.

Dokarmianie jesienne – 4 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego.

Polewanie uliczek międzyramkowych, podkarmianie pobudzające – 20 ml Apistymu na 1 litr syropu cukrowego.

Temperatura syropu nie powinna przekraczać 50 °C.

Stosowanie jesienią

Apistym należy stosować w roztworze syropu cukrowego lub w gotowych pokarmach dla pszczół w koncentracji 4 ml preparatu na 1 litr syropu.

Przygotowany syrop cukrowy lub gotowy pokarm z Apistymem należy podawać rodzinom pszczelim **podczas dokarmiania jesiennego.**

Ilość podawanego pokarmu dostosować do siły rodziny. Zalecana dawka Apistymu na jedną rodzinę to 40 ml (10 litrów syropu). W przypadku podania mniejszej ilości syropu zaleca się dodatkowe, dwukrotne (w odstępie 7 – 10 dni) polewanie uliczek międzyramkowych roztworem Apistymu w syropie cukrowym o koncentracji 20 ml Apistymu na 1 litr w ilości 5 – 10 ml na uliczkę.

Stosowanie wiosną i latem

Polewać uliczki pszczele roztworem Apistymu w syropie cukrowym (20 ml na 1 litr) w ilości 5 – 10 ml na uliczkę, dwukrotnie (w odstępie 7 – 10 dni). Przygotowany do polewania uliczek roztwór Apistymu można także podać jako podkarmianie pobudzające w ilości 0,5 – 1 l na rodzinę. Powyższe dawkowanie zastosować przy każdym podkarmianiu pobudzającym.

Apistym można podawać także z ciastem w ilości 4ml preparatu na 1kg ciasta na rodzinę pszczelą.

Po otwarciu zużyć niezwłocznie. W przypadku niewykorzystania całej butelki preparat można przechować w lodówce maksymalnie 14 dni.

Apistym został opracowany przy udziale jednostek naukowo-badawczych UMCS z Lublina, UP Lublin i UJ z Krakowa. Skład jest chroniony zgłoszeniem patentowym, a jego właściwości potwierdziły badania laboratoryjne oraz zastosowanie w pasiekach.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wielkość opakowania : 200 ml

Okres ważności : 12 miesięcy

Biowet Puławy Sp. z o. o. ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./fax (81) 886 36 11, (81) 886 91 00, www.biowet.pl
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: **α PL0614003p**

2018-11-19 Data opracowania ulotki