

Preparat na trudno gojące się rany u bydła, koni, owiec, psów, kotów i kóz.

Wskazania:

Preparat stosuje się wspomagająco przy trudno gojących się ranach, miejscowych procesach martwiczych, odleżynach, ropniach, przetokach ropnych, krwinkach, otarciach skóry, wrzodach podszwy, zapaleniach szpary międzypalcowej

Działanie:

Maść do stosowania zewnętrznego dla koni, bydła, owiec, kóz, psów i kotów. Maść PANA VEYXAL jest preparatem do stosowania lokalnego, zawierającym kombinację odpowiednio dobranych enzymów oraz witamin A i E. Działanie zawartych w preparacie enzymów proteolitycznych prowadzi do szybkiego rozpuszczenia i upłynnienia martwych i patologicznie zmienionych komórek, produktów rozpadu tkanek i bakterii. Zdrowe komórki zawierają substancje o działaniu antyenzymatycznym, które chronią je przed działaniem enzymów. Powyższy selektywny mechanizm działania, prowadzi do szybkiego oczyszczenia się rany, usunięcia ropnej wydzieliny zapalnej i przyspieszenia procesu gojenia.

W przebiegu procesów zapalnych dochodzi do zmian w lokalnym układzie naczyniowym prowadzących m.in. do niedotlenienia, kwasicy i obumarcia komórek. Zawarte w preparacie enzymy dzięki działaniu proteolitycznemu i fibrynolitycznemu zapobiegają powstawaniu takich zmian. Enzymy, zawarte w maści PANA VEYXAL wpływają również korzystnie na komórki systemu fagocytarnego i częściowo także na kompleksy immunologiczne powstające w przebiegu procesu zapalnego. Zawarte w preparacie enzymy powodują zwiększony naciek komórek fagocytarnych, głównie granulocytów i makrofagów, które w obecności enzymów i witaminy E jako antyoksydantu, zwiększają swoją aktywność fagocytarną.

Zawarte w preparacie witamina A i witamina E pełnią funkcję ochronną i stymulują odnowę komórek skóry, błony śluzowej i tkanki łącznej. Witamina E osłania neutrofile i makrofagi przed immunosupresyjnym działaniem czynników chorobotwórczych. Pozytywna rola witaminy E polega również na stabilizacji błon komórkowych i wydatnym działaniu antytoksycznym. Witamina A, przyczynia się do szybkiej regeneracji uszkodzonych komórek pobudzając tym samym proces gojenia. Dłuższe utrzymywanie się aktywnej biologicznie formy witaminy A zapewnia octan α -tokoferolu, zapobiegający utlenieniu witaminy A.

Enzymy zawarte w maści PANA VEYXAL wykazują skuteczne działanie w przypadkach zmian zgorzelinowych i ropnych w ranie, przyspieszając, ewentualnie w połączeniu z terapią antybiotykową, proces gojenia. Maść można również stosować miejscowo w połączeniu z odpowiednimi antybiotykami. Substancje zawarte w maści PANA VEYXAL nie odkładają się w organizmie i tym samym po stosowaniu preparatu nie jest konieczne zachowanie okresu karencji na tkanki przeznaczone do spożycia.

Przeciwwskazania:

Brak

Dawkowanie:

Maść PANA VEYXAL należy lekko wetrzeć lub nałożyć, po uprzednim oczyszczeniu i osuszeniu, na miejsca zmienione chorobowo. Zabieg powtarzać kilkakrotnie w zależności od szybkości ustępowania zmian patologicznych.

Skład:

10 g preparatu zawiera:

chymotrypsyna 1,70 mg, trypsyna 8,60 mg,

papaina 18,50 mg, witamina A (forma olejowa)

42.500 j.m. (IU), octan α -tokoferolu 25,00 mg