

RodiCare® Pregno 50 ml

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla królików oraz świnek morskich do regulowania zaburzeń hormonalnych (cysty jajnikowe u świnek morskich , ciąża urojona u królików)

Duże **cysty jajnikowe** uciskają narządy w jamie brzusznej, zwłaszcza jelita, ale również płuca, doprowadzając do niestrawności, wychudzenia lub trudności w oddychaniu.

Małe, aktywne hormonalnie cysty, doprowadzają do utraty włosów po bokach ciała oraz na brzuchu oraz są przyczyną agresywnego zachowania.

Cysty jajnikowe mogą być leczone hormonalnie albo poprzez ich punkcję. Często dochodzi do nawrotów i leczenie musi być powtarzane. Jeśli te próby leczenia okażą się nieskuteczne, pozostaje konieczność zabiegu chirurgicznego.

U samic królików występuje bardzo często **ciąża urojona** z towarzyszącym wypływem mleka.

Zwierzęta wykazują zwiększoną agresywność w stosunku do zwierząt i ludzi, „warczą” oraz budują gniazdo. Długotrwałe ciąże urojone mogą doprowadzić do rozwoju ropomacicza, raka macicy, zapalenia jajników.

Zaburzenia hormonalne królików i gryzoni są spowodowane najczęściej – trzymaniem zwierząt pojedynczo lub w grupach nie mieszanych, brakiem reprodukcji).

RodiCare® Pregno jest łagodnym preparatem roślinnym, który pomaga przywrócić ten brak równowagi hormonalnej.

-posiada wysoki indeks terapeutyczny, bez skutków ubocznych

- również dla starszych i schorowanych zwierząt

Skład:

Syrop z buraków cukrowych

Ekstrakt z sasanki (*Pulsatilla vulgaris*) 2%

Gumowywica *Asa foetida* (Zapaliczka cuchnąca) 2%

Składniki analityczne:

Białko surowe 0,3%

Włókno surowe 0%

Oleje i tłuszcze surowe 0%

Popiół surowy 0,2%

Sód 0,1%

Wilgotność 90,4%

Masa netto 50 ml

Postać handlowa:

Buteleczek 50 ml ze strzykawką

Sposób podawania:

Podawać wymieszane z pokarmem lub bezpośrednio do pyszczka, według wagi ciała:

Świnki morskie, króliki miniaturowe:

2x dziennie po 0,25-0,3 ml

Króliki :

2x dziennie po 0,4-0,5ml

Zalecany okres podawania:

Co najmniej 16-20 dni.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć lub wydłużyć okres podawania (do ok. 3 tygodni od zakończenia leczenia)

Uwagi:

Przeciwwskazane przy ropomaciczu.

Samice z zaburzeniami hormonalnymi (jak np. cysty jajnikowe lub ciąża urojona) powinny być zawsze pod kontrolą lekarza weterynarii.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Po użyciu umyć strzykawkę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni i w ciemnym miejscu.

Po otwarciu zużyć.

Okres trwałości 24 miesiące