

Sabunol szara obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psa 75 cm

(Sabunol)



Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Produkt biobójczy, nr pozwolenia: 2885/05

Środki ostrożności i warunki stosowania

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Sposób Działania

W czasie noszenia obroży, substancja czynna uwalnia się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na pasożyty zewnętrzne w sposób kontaktowy. Obroża zaczyna działać natychmiast po założeniu. Pełen efekt działania uzyskuje się po upływie 24 godzin.

Zastosowanie

Obroża Sabunol to nowoczesny, wieloskładnikowy preparat do likwidacji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. Unikatowe, jedyne na rynku połączenie imidaklopyrydu, permetryny oraz piryproksyfenu przesądza o dużej skuteczności preparatu. Wygodna w użyciu sprzączka zapewnia komfort stosowania.

Zalecenia

- Likwidacja kleszczy - do 4 miesięcy
- Likwidacja dorosłych pcheł - do 6 miesięcy
- Likwidacja larw i jaj pcheł do 6 miesięcy
- Przerwanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa

Składniki aktywne

- (trans/cis) Permetryna (75:25) 3,6% - działa insektobójczo natychmiast po podaniu, także na kleszcze. Jest substancją nietoksyczną dla większości ssaków.
- Imidaklopyryd 1,1% - działa insektobójczo wywołując nieodwracalny paraliż i śmierć pcheł.

- Piryproksyfen 0,4% - hormon juvenilny (IGR), nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u kotów
- Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy
- Nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie rekonwalescencji

Sposób Użycia

Obrożę dostosować do obwodu szyi zwierzęcia i założyć. Obroża jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym efektem procesu produkcyjnego i stopniowo zanika podczas używania.