



FATROXIMIN Intrauterine Foam

0,75 g / 100 g

Aerazol dla bydła i koni



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

FATROXIMIN Intrauterine Foam 0,75 g/100 g aerazol dla bydła i koni

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Rifaksymina 0,75 g / 100 g

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie ostrych i chronicznych bakteryjnych stanów zapalnych dróg rodnych u krów, jałówek i klaczy: *endometritis, metritis, cervicitis, vulvovaginitis, pyometra*.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na rifamycyny.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

DAWKOWANIE I DROGI PODANIA

Krowy i jałówki:

- ostry i chroniczny stan zapalny błony śluzowej macicy, zapalenie szyjki macicznej, 50-200 mg rifaksyminy jednorazowo wewnątrzmacicznie tj. odpowiednio ½ - 2 pojemników po 13,4 g, w zależności od wielkości macicy, którą kontrolujemy podczas badania rektalnego,
- zapalenie pochwy i warg sromowych: 100 mg (1 pojemnik) dopochwowo, powtórzyć podanie w tej samej dawce po 24 godz.,
- ropomacizce: 50-200 mg (½ - 2 pojemników) wewnątrzmacicznie, po uprzednim usunięciu z jamy macicy wydzieliny ropnej.

Klacz:

- ostry i chroniczny stan zapalny błony śluzowej macicy: 100-400 mg jednorazowo odpowiednio (1-4 pojemników), w zależności od wielkości macicy.

Aplikacja preparatu może być powtórzona w zależności od stanu narządu rodowego, który ocenia lekarz weterynarii.

W zależności od decyzji lekarza, podanie produktu można powtórzyć po 24-48 godzinach od pierwszego podania. Preparat może być podany dwukrotnie w odstępie 4-7 dni. Jeżeli terapia jest nieskuteczna, dalsze stosowanie produktu nie jest wskazane.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Preparat podawać po uprzednim zastosowaniu PGF2α lub jej analogu w celu wywołania lizy ciała żółtego (jeżeli występuje) i otwarcia szyjki macicy, a następnie usunięciu z jamy macicy wydzieliny ropnej.

Dokładnie wstrząsnąć pojemnik z preparatem i podłączyć do końcówki rozpylającej ustawiając go pionowo do podłoża.

Błędem jest ustawienie pojemnika z preparatem równolegle lub skośnie do podłoża.

Po wprowadzeniu do macicy aerazol tworzy pianę o 6-krotnej większej objętości niż pojemnik ciśnieniowy.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne bydła: zero dni. Mleko: zero dni.

Nie stosować u klaczy, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50° C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Chronić przed dziećmi.

Nie stosować przez całość okresu trwania ciąży.

Preparat może być stosowany w okresie laktacji.

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:

FATRO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bolońska 1, 55-040 Kobierzycze

Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82