

Master label Bovikalc

Bovikalc

Mineralny dodatek odżywczy ograniczający ryzyko wystąpienia porażenia poporodowego u krów mlecznych

4 x 192 g

Właściwości:

Bovikalc to bolus o wysokiej zawartości wapnia, który ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia różnego stopnia hypokalcemii u krów mlecznych w okresie okołoporodowym.

Preparat Bovikalc zawiera chlorek wapnia, który szybko rozpuszcza się w żwaczu, oraz siarczan wapnia, który rozpuszcza się dopiero po rozłożeniu przez mikroflorę żwacza.

Bolus 192 g

Każde opakowanie zawiera 4 bolusy

Skład:

Chlorek wapnia, siarczan wapnia, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym.

Jeden bolus zawiera 43 g wapnia; z czego 71% w postaci chlorku wapnia i 29% w postaci siarczanu wapnia.

Substancje pomocnicze:

Informacje można uzyskać u dostawcy

Składniki analityczne

Wapń	22.2%
Maksymalna wilgotność	32.0%

Bovikalc nie zawiera sodu, fosforu ani magnezu.

Sposób użycia i dawkowanie:

Preparat przeznaczony do stosowania u krów mlecznych zagrożonych porażeniem poporodowym – w szczególności krów wysokowydajnych i osobników, u których wystąpiło porażenie poporodowe.

W przypadku krów zagrożonych porażeniem poporodowym należy podać 4 bolusy:

- Pierwszy w momencie wystąpienia pierwszych objawów porodu
- Drugi bolus – niezwłocznie po porodzie
- Trzeci bolus – 12-15 godzin po porodzie
- Czwarty bolus – 24-30 godzin po porodzie

W przypadku krów, którym podano wcześniej wapń w iniekcji, należy podać 2 bolusy:

- Pierwszy bolus – 2-3 godziny po iniekcji wapnia
- Drugi bolus – 12-15 godzin później

Przed zastosowaniem zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii.

Środki ostrożności

Preparatu Bovikalc nie wolno podawać krowom wykazującym kliniczne objawy porażenia poporodowego, ponieważ mogą im towarzyszyć zaburzenia połykania.

Nie należy podawać preparatu Bovikalc krowom zalegającym.

Nie podawać, jeżeli powłoka bolusa jest uszkodzona lub odłamuje się.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze maks. 30°C.

Bolus należy przechowywać w pojemniku do ostatniej chwili przed użyciem, ponieważ jest on podatny na wilgoć zawartą w powietrzu.

Nr partii:

Najlepiej zużyć przed (MM, RR):

Dystrybucja i informacja

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

ul Wołoska 5,

02-675 Warszawa

tel 22- 699-0-699 / fax 22-6990-698

Wytwórca

Boehringer Ingelheim Dania A/S

DK-2100 Kopenhaga OE

208-R854833