



Wskazania

- ✓ Alergia pokarmowa
- ✓ Nietolerancja pokarmowa
- ✓ Dla szczeniąt

Przeciwwskazania

- ✗ Nadwrażliwość na białko indyka



Dodatkowe informacje

- + Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i węglowodanów (indyk i ziemniaki)
- + Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub innym niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej) w formie problemów skórnych lub problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)
- + Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gryzienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany skórne.



Czyste mięso indyka i ziemniaki rzadko powodują reakcję alergiczną



Karma bez zbożowa, zawiera tylko węglowodany z ziemniaków



Spełnia zapotrzebowanie pokarmowe szczeniąt po odsadzeniu

Dodatkowa porada

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięcia ponownego zachorowania.

Przeciętna analiza (na kilogram)

	Mokra (puszka)
Białko	9,0%
Tłuszcz	6,5%
Popiół	3,2%
Włóknik	1,0%
Wilgotność	78,5%
Węglowodany	1,8%
Witamina A	2 000 IU
Witamina D3	300 IU
Witamina E	40 mg
Wapń	0,22%
Fosfor	0,18%
Sód	0,04%
Potas	0,14%
Cynk	16 mg
Copper	1,0 mg
Jod	0,38 mg
Iron	6,5 mg
Mangan	1,1 mg
Energia (ME)	3,9 MJ
	928 kcal

Składniki



Karma mokra: mięso indyka, ziemniaki, olej słonecznikowy, olej z oliwek, witaminy i minerały

Dawki pokarmowe (na dzień)

Waga (kg)		5	10	20	30	40	50	60
Mokra (gram)	min.	360	605	970	1360	1705	2015	2295
	max.	445	735	1190	1670	2070	2450	2815

Dawkowanie dla szczeniąt :

25%-75% wagi ciała psa dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa psa dorosłego.
75%-100% wagi ciała psa dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa psa dorosłego