



Wskazania

- ✓ Alergia pokarmowa
- ✓ Nietolerancja pokarmowa
- ✓ Wskazana dla kociąt

Dodatkowe informacje

- + Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i węglowodanów (jagnięcina i ryż)
- + Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub innych niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej) w formie problemów skórnych lub problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)
- + Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gryzienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany skórne.

Dodatkowa porada

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięcia ponownego zachorowania.

Przeciwwskazania

- ✗ Nadwrażliwość na białko jagnięce



Czyste mięso jagnięce i ryż rzadko powodują reakcję alergiczną



Optymalna proporcja Omega 3/6 redukuje obieg mediatorów zapalnych i zapewnia zdrową skórę i włosy



Ryż jako źródło węglowodanów jest łatwo strawnym pokarmem

Przeciętna analiza (na kilogram)

	Sucha	Mokra
Białko	27,0 %	9,0%
Tłuszcz	16,0 %	6,5%
Popiół	8,5 %	3,0%
Włókniak	1,5 %	1,0%
Wilgotność	8,0 %	80,0%
Węglowodany	39,0 %	0,5%
Witamina A	15 000 IU	2 000 IU
Witamina D3	1 000IU	300 IU
Witamina C	200 mg	
Witamina E	200 mg	40mg
Wapń	1,7%	0,27%
Fosfor	1,2%	0,21%
Sód	0,55 %	0,05%
Potas	0,80%	0,18%
Cynk	85 mg	16 mg
Linoleic acid	3,9%	
Linolenic acid	0,40%	
Tauryna	1 800 mg	2 500 mg
Energia (ME)	15,4 MJ	3,7 MJ
	3673 kcal	886 kcal

Składniki



Karma sucha: ryż, mączka jagnięca, tłuszcz rybi i drobiowy, witaminy i pierwiastki śladowe, pulpa buraczana, drożdże

Karma mokra: mięso i podroby (jagnię), zboża (ryż), pulpa buraczana, minerały, witaminy, oleje i tłuszcze (olej słonecznikowy)

Dawki pokarmowe (na dzień)

Waga (kg)		2	3	4	5	6
Sucha (gram)	min.	35	50	60	70	80
	max.	45	60	70	80	90
Mokra (gram)	min.	115	150	215	245	290
	max.	150	200	245	300	340

Dawkowanie dla kociąt :

25%-75% wagi ciała kota dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa kota dorosłego
75%-100% wagi ciała kota dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa kota dorosłego