

INJECTIO GLUCOSI ISOTONICA ET NATRII CHLORATI ISOTONICA 1:1 WET BAXTER

GLUKOZA 25 G/1000 ML, SODU CHLOREK 4,5 G/1000 ML,
ROZTWÓR DO INFUZJI DLA PSÓW, KONI, KOTÓW, ŚWIŃ,
BYDŁA, OWIEC, KÓZ

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej(-ych):

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Glukoza 25g

Sodu chlorek 4,5g

Wskazania lecznicze:

Do stosowania w przypadkach odwodnienia ogólnego i komórkowego, jako uzupełnienie niedoborów osocza, w biegunkach.

Psy, koty - nawadnianie zwierząt z niewydolnością krążenia, wstrząs kardiogeny, odwodnienie wywołane biegunkami, nawadnianie zwierząt z niewydolnością nerek, nawadnianie pacjentów z niewydolnością wątroby, nawadnianie pacjentów z hipernatremią.

Konie - odwodnienie wywołane biegunkami, encefalopatia wątrobowa, wstrząs septyczny.

Bydło, owce, kozy, świnie - odwodnienie wywołane biegunkami.

Przeciwwskazania: Stany odwodnienia hipotonicznego, hipokaliemia, zbyt duże stężenie któregośkolwiek ze składników roztworu, hiperwolemia.

Działania niepożądane: W trakcie leczenia mogą wystąpić: przewodnienie, hipernatremia, hiperchloremia. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

Nieodpowiednie stosowanie roztworów może być przyczyną zaburzeń elektrolitowych.

W przypadku dożylnego stosowania płynu o temperaturze innej niż temperatura ciała może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl>

(Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt: Pies, koń, kot, świnia, bydło, owca, koza.

Dawkowanie i droga(-i) podania:

Konie, bydło: 1000 ml - 5000 ml

Kozy, owce, świnie: 250 ml - 1250 ml

Psy, koty: od 2 ml/kg mc. do 20 ml/kg mc.

Dożylnie, dootrzewnowo, podskórnice.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Instrukcja użytkowania leku

Płyn o temperaturze pokojowej podawać natychmiast po założeniu przyrządu do podawania

wlewów kroplowych.

Wprowadzenia do płynu dodatkowego leku należy dokonać w miejscu późniejszego połączenia z przyrządem do podawania wlewów kroplowych.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Okres(-y) karencji:

Psy, koty - nie dotyczy

Bydło, konie, świnie, owce, kozy - zero dni

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. W czasie przechowywania i transportu należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zimnem, kurzem, opadami atmosferycznymi oraz przed działaniem par rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na butelce.

Opakowanie raz rozpoczęte nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, preparatu nie należy stosować.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, jeżeli konieczne: Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Należy kontrolować skład elektrolitowy krwi oraz wskaźniki stopnia nawodnienia.

Można podawać tylko z produktami leczniczymi nie wykazującymi z preparatem niezgodności farmakochemicznych.

Nie należy podawać w połączeniu z aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12 oraz z preparatami zawierającymi w swoim składzie Ag^+ , Pb^{2+} , Hg^{2+} .

Należy uwzględnić potencjalną możliwość wystąpienia niezgodności produktów leczniczych dodawanych do produktu leczniczego weterynaryjnego Injectio Glucosi Isotonica et Natrii Chlorati Isotonica 1:1 WET Baxter, zwracając uwagę na możliwe zmiany zabarwienia i (lub) tworzenie się osadów, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się też z informacją o produkcie, który ma być dodany. Przed dodaniem innego produktu leczniczego należy sprawdzić czy zakres pH, w którym jest on skuteczny, jest taki sam jak dla produktu leczniczego weterynaryjnego Injectio Glucosi Isotonica et Natrii Chlorati Isotonica 1:1 WET Baxter. W razie dodawania innych produktów leczniczych do produktu leczniczego weterynaryjnego Injectio Glucosi Isotonica et Natrii Chlorati Isotonica 1:1 WET Baxter mieszaninę należy natychmiast podać.

Przedawkowanie płynu może objawić się hipertonią płynu pozakomórkowego, odwodnieniem komórek.

Katalizujące działanie glukozy powoduje rozkład hydrolityczny większości antybiotyków z grupy penicylin. Zawarty w roztworze glukozy 5-HMF wchodzi w reakcję z pierwszorzędowymi grupami aminowymi ($-NH_2$), co prowadzi do całkowitego rozkładu insuliny oraz albuminy ludzkiej. Obecność

5-HMF wpływa również na rozkład dopaminy i lewarterenolu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie:

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje: Injectio Glucosi Isotonica et Natrii Chlorati Isotonica 1:1 WET Baxter jest dostępne w butelkach typu bottle-pack z polietylenu (LDPE), o pojemności 250 ml i 500 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o.

Wytwórca: Baxter Manufacturing Sp. z o.o.