

# DINDORAL

## NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DINDORAL liofilizat dla indyków i bażantów

## SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda dawka szczepionki zawiera:

atenuowany szczep *Domermuth* wirusa krwotocznego zapalenia jelit indyków (HEV) nie mniej niż 9 EU

1 EU: qs do uzyskania u szczepionych zwierząt surowicy pozytywnej w teście ELISA

## POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat.

## WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

Czynne uodpornianie brojlerów indyckich przeciw krwotocznemu zapaleniu jelit.

Czynne uodpornianie bażantów przeciw chorobie marmurkowej śledziony.

## DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA

Program szczepień jest wspólny dla indyków i bażantów.

Liofilizat należy rozpuścić w wodzie wolnej od zanieczyszczeń środkami antyseptycznymi i /lub dezynfekcyjnymi, a następnie rozcieńczyć w takiej ilości wody, jaką ptaki wypiją w ciągu 1-2 godzin. Dwie godziny przed immunizacją ptaki nie powinny dostawać wody do picia.

Szczepionkę podaje się doustnie w wodzie do picia.

Szczepionkę podaje się jednokrotnie 4-tygodniowym ptakom.

Przestrzegać zasad aseptyki. Do przygotowania szczepionki używać naczyń czystych, wolnych od zanieczyszczeń środkami dezynfekcyjnymi.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie szczepić indyków w stadach rodzicielskich i przyszłych stadach reprodukcyjnych.

Nie podawać perliczkom.

## OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni.

## SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT

Szczepić należy tylko zdrowe ptaki

W dniu poprzedzającym szczepienie oraz dzień po szczepieniu ptaki nie powinny doznawać żadnych stresów (przenoszenie, obcinanie dziobów, itp.)

Przed szczepieniem młodych bażantów zalecane jest poddanie ich zapobiegawczo odrobaczaniu (kokcydia, nicienie), a po szczepieniu należy podawać preparaty przeciwbakteryjne, skierowane przeciwko drobnoustrojom, którymi ferma jest zakażona.

Szczep szczepionkowy może rozprzestrzeniać się na zwierzęta nieszczepione.

## SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKTY LECZNICZE WETERYNARYJNE ZWIERZĘTOM

Brak.

## DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Obserwowano okresowe poszczepienne obniżenie odporności humoralnej u indyckich niosek jaj SPF oraz krótkotrwałe i znaczące obniżenie poziomu limfocytów u standardowych niosek indyckich.

**STOSOWANIE W CIĄŻY LUB LAKTACJI LUB W OKRESIE NIEŚNOŚCI**

Nie dotyczy.

**INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI LUB INNE RODZAJE INTERAKCJI**

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego produktu z innymi (albo tego samego dnia, albo w innym czasie) nie zostało przedstawione.

**NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA

**ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00, fax. 22 280 00 01.

**NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU** 169/95

**PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY Z PRZEPISU LEKARZA – Rp.**

**DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU**

Luty 2016r.

**DATA OPRACOWANIA MATERIAŁU REKLAMOWEGO**

Luty 2016r.